

Dosis del Acetaminophen en Niñas(os) y Adolescentes

ATENCIÓN: Dar Acetaminophen cada 4 a 6 horas en caso de dolor o fiebre. Este instructivo contiene las dosis de una medicina que no necesita receta o prescripción médica. Siga las instrucciones solamente cuando su proveedor de salud se lo indique. Siempre consulte a su proveedor de salud antes de darle cualquier medicina a su hija(o).

Peso del Niña(o) en Libras (lbs)	Menos de 12 lbs (Menos de 5 kg)	12 - 17 lbs (5 - 7 kg)	18 - 23 lbs (8 - 10 kg)	24 - 35 lbs (11 - 16 kg)	36 - 47 lbs (17 - 21 kg)	48 - 59 lbs (22 - 27 kg)	60 - 71 lbs (28 - 32 kg)	72 - 95 lbs (33 - 43 kg)	96 + lbs (44+ kg)
Jarabe 160 mg/5 mL (Utilice Medida Copa o Jeringa)	1.25 mL	2.5 mL	3.75 mL	5 mL	7.5 mL	10 mL	12.5 mL	15 mL	20 mL
Tabletas Masticables 80 mg			1.5 Tabletas	2 Tabletas	3 Tabletas	4 Tabletas	5 Tabletas	6 Tabletas	8 Tabletas
Tabletas Masticables 160 mg (Junior)				1 Tableta	1.5 Tabletas	2 Tabletas	2.5 Tabletas	3 Tabletas	4 Tabletas
Tabletas de Adultos 325 mg						1 Tableta	1 Tableta	1.5 Tabletas	2 Tabletas
Tabletas de Adultos 500 mg								1 Tableta	1 Tableta

Padres y cuidadores deben recordar que:

- Lea y siga las instrucciones de la etiqueta de todos los productos de Acetaminophen
- Tomar cada 4 a 6 horas de ser necesario
- **NO** se debe exceder la dosis más de 5 veces al día
- **NO** utilizar junto con otros productos que contengan Acetaminophen
- Mantenga todas las medicinas fuera del alcance de los niños
- **NO** administrar medicamentos para adultos en niños
- Utilice solo la inyectadora que viene junto con el medicamento para la suspensión oral
- Utilice solo la medida (copa) que viene con el producto para la suspensión oral
- **Las tabletas masticables de niños no son iguales que las masticables Junior.** Las Junior contienen 160 mg de Acetaminophen y las de niños contienen 80 mg de Acetaminofen.
- **Todas las presentaciones para niños y niñas de Acetaminophen Oral en suspensión tienen la misma concentración (160 mg/5 mL)**

Dosis del Ibuprofen en Niñas(os) y Adolescentes

ATENCIÓN: NO DAR IBUPROFEN A NIÑAS(OS) MENORES DE 6 MESES. Para mayores de 6 meses dar cada 6 u 8 horas si tienen dolor o fiebre. Este instructivo contiene las dosis de una medicina que no necesita receta o prescripción médica. Siga las instrucciones solamente cuando su proveedor de salud se lo indique. Siempre consulte a su proveedor de salud antes de darle cualquier medicina a su hija(o).

Peso del Niña(o) en Libras (lbs)	12 - 17 lbs (5 - 7 kg)	18 - 23 lbs (8 - 10 kg)	24 - 35 lbs (11 - 16 kg)	36 - 47 lbs (17 - 21 kg)	48 - 59 lbs (22 - 27 kg)	60 - 71 lbs (28 - 32 kg)	72 - 95 lbs (33 - 43 kg)	96 + lbs (44+ kg)
Gotas o Suspensión Concentrada 50 mg/1.25 mL. Use el Gotero.	1.25 mL	1.875 mL						
Líquido 100 mg/5 mL (Utilice Medida Copa o Jeringa)	2.5 mL	3.75 mL	5 mL	7.5 mL	10 mL	12.5 mL	15 mL	20 mL
Tabletas Masticables 50 mg			2 Tabletas	3 Tabletas	4 Tabletas	5 Tabletas	6 Tabletas	8 Tabletas
Tabletas de Adolescentes 100 mg tablets					2 Tabletas	2.5 Tabletas	3 Tabletas	4 Tabletas
Tabletas de Adultos 200 mg					1 Tableta	1 Tableta	1.5 Tabletas	2 Tabletas

*Cucharada = Cada 5 ml de Ibuprofen contienen 100 mg.
 *Ibuprofen es un anti-inflamatorio y no es un esteroideo.
 *Calcule las dosis con las medidas que vienen con el medicamento.

Por favor refiérase a los Hechos de Drogas en la etiqueta del producto para advertencias completas. Instrucciones Importantes para un Uso Adecuado:

- Lea y guarde los cartones para las advertencias y la información completas sobre los productos del Ibuprofen
- Recuérdelo a los pacientes que si están tomando otros medicamentos que contengan AINE con receta o sin prescripción (aspirina, Advil, naproxen, o otros), deben consultar con su proveedor médico antes de tomar cualquier producto de Ibuprofen
- No se deben administrar dosis de adultos los niños.

Agite el medicamento antes de usar.